

ПРЕДАВАЊА ИЗ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЈЕ




- Атмосфера-

Проф. др Бранислав Драшковић


- Клима представља скуп временских појава и атмосферских процеса које карактеришу средње дугогодишње стање атмосфере изнад неког простора
- Према простору истраживања климу дијелимо на климу атмосфере и климу земљишта



- Према величини простора истраживања климу атмосфере дијелимо на:
- Макроклиму (климу региона, од 100-10,000 км)
- Мезоклиму (локалну климу, нпр. климу града, планине, долине, од 1-100 км)
- Топоклиму (климу мањег простора, нпр. врха планине, дна долине, 0,1-1 км)
- Микроклиму (климу малих површина, нпр. стабло, скупина дрвећа, 0,1 до 100 м)



- По домену истраживања климатологију дијелимо на општу и специјалну
- Општа проучава врсте, значај и узроке постанка многобројних промјена у просјечним временским стањима атмосфере изнад разних области



- Специјална климатологија се бави утицајем климе у разним областима: индустрији, туризму и др.
- Такође ту спада и биоклиматологија, агроклиматологија и шумарска климатологија.
- Агроклиматологија и шумарска еоклиматологија се баве еколошким условима живота биљака, животиња и човјека у пољопривреди, шуми и природи уопште.



Општи подаци о атмосфери


Површински дио Земље сачињавају четири омотача (сфере):

1. атмосфера – ваздушни
2. хидросфера – водени
3. литосфера - стјеновити
4. биосфера - простор насељен органским свијетом



- **Атмосфера** – ваздушни омотач Земље
- Доња граница – површина Свјетског мора и копно.
- Горња граница се не може одредити, па је прихваћена тзв. **физичка граница атмосфере** (изнад полова 21.644 км, изнад екватора 35.711 км)

Атмосфера Земље у њених првих 500 милиона година значајно се разликовала од данашње, с доминацијом отровних сумпорних и азотових спојева.



Атмосфера је битна за Земљу и њен живи свијет из сљедећих разлога:



- преображава енергију Сунчевих зрака
- задржава примљену топлоту
- штити Земљу од израчивања
- слаби дјеловање космичких и ултравиолетних Сунчевих зрака (штетних за живи свијет)
- Омогућава кружно кретање воде
- Штити од метеора

- Да нема атмосфере на Земљи би средња годишња температура била знатно нижа
- Дању би се стијене загријавале и преко 100°C , док би им ноћу температура падала до -100°C .



Састав атмосфере




- **Атмосферу чине:** Азот 78,084%, кисеоник 20,946%, аргон 0,934%, угљен-диоксид 0,033%, и остали гасови
- примјесе у атмосфери: водена пара, лебдеће примјесе (пепео, чађ, честице соли), итд.
- суви ваздух нема примјеса.

- Примјесе могу бити течне, чврсте и гасовите и њихов удио у ваздуху је промјенљив
- Аеросоли су углавном чврсте честице (лебдеће) – прашина, вулкански пепео, чађ, честице соли, бактерије и сл.
- Водена пара је важна примјеса ваздуха




- Азот је инертан гас али се под утицајем ел. пражњења у атмосфери спаја са кисеоником и водоником у амонијак и азотну киселину, који се заједно једине у нитрате који су важни за биљке којима служе за исхрану (преко падавина доспјева у земљиште)
- кисеоник је најактивнији састојак атмосфере и настао је дјеловањем биљака као продукт фотосинтезе



- Иако је колична угљен-диоксида мала он је важан јер апсорбује Сунчево зрачење а биљке га користе у процесу фотосинтезе
- У атмосферу долази из вулкана и сагоријевањем органских материја па га знатно више има у градовима и индустријским центрима него у планинама




- Треба истаћи да угљен-диоксид и водена пара интензивно апсорбују Земљино дуготаласно зрачење
- Температура Земље би била нижа за 21°C , тј. износила би -7°C у просјеку, што значи да су угљен-диоксид и водена пара топлотни регулатори у тропосфери



Утицај састава атмосфере на биљке

- Биланс и баланс атмосферских гасова практично је главни покретач физиолошких и хемијских процеса у биљци, као и њеног комплетног раста и развоја
- Постоји значајна разлика у реакцији C_3 и C_4 биљака* и фотосинтезе које се у њима одвија у односу на пораст CO_2 у условима када не постоји мањак влаге



* C_3 биљке су биљке умјерених климата (пшеница, сунцокрет, соја и јечам) док су C_4 биљке аридних климатских зона (кукуруз, сирак) у којима преовлађује топло или тропско вријеме.

- При промјени концентрације CO_2 од 180 ppm до 700 ppm, интензитет фотосинтезе се мијења за 30% код C_3 биљака или чак 142% код C_4 биљака
- Међутим, постоји лимит када даље повећавање не доводи до повећања интензитета фотосинтезе (тзв. сатурација)




- Такође, концентрација CO_2 утиче на интензитет транспирације због повећања стоматерног отпора - већи ниво CO_2 доводи до смањења транспирације
- Међу загађивачима у атмосфери најзначајнији током XX вијека су SO_2 (током 90-тих емисија значајно смањена), а касније група азотних оксида (NO и NO_2) и озон (O_3)
- Ови гасови могу произвести значајна оштећења на биљкама, посебно код стоматерног апарата, нарочито када су изложене штетном дејству дуже времена




Утицај биљака на састав атмосфере

- Најзначајнији извор кисеоника у атмосфери је процес фотосинтезе
- С друге стране, кисеоник се троши током процеса оксидације органске (биљака, животиња и дисање бактерија) и неорганске материје, као и аеробно разлагање органске материје



- Азот настаје и ослобађа се из земљишта током процеса нитрификације и денитрификације у којима долази до ослобађања N_2 , N_2O , NO , NH_4)
- Насупрот томе, биолошка активност која се одиграва у земљишту (прије свега фиксација азота) нарочито је одговорна за уклањање азота из атмосфере.




- Такође, биљке утичу на састав атмосфере и у механичком и физиолошком смислу.
- Биљни склоп, нарочито шумски, повећава храпавост површине, мијења ток ваздушних маса и продукује размјену гасова између биљака (шуме) и атмосфере



- Присуство биљака утиче на биланс угљеника преко процеса дистрибуције биомасе, дисања, асимилације угљен-диоксида, разградње органске материје и минерализације хранљива.
- У случају воде и водене паре, вегетација увијек повећава влажност ваздуха преко евапотранспирације и умањује транспорт водене паре од површине Земље ка атмосфери, ИТД...

Kako funkcioniše ugljenični ciklus



Izvor: IPCC


BBC

Вертикална структура атмосфере (стратификација атмосфере)


Атмосфера се састоји од 5 главних слојева:

1. Тропосфера (80% масе атмосфере, до 18 км)
2. Стратосфера (18-55 км)
3. Мезосфера (55-85 км)
4. Термосфера (85-800 км)
5. Егзосфера (800-3000)

Између њих су прелазне зоне (паузе): тропопауза, стратопауза, мезопауза, термопауза



- **Тропосфера:** најнижи и најгушћи дио атмосфере у којем се одвија циркулација ваздуха и сав живот на Земљи
- Изнад полова до 9 км висине а изнад екватора 18 (на умјереним ширинама просјечно између 11-13 км)
- Доњи дијелови топлији (јер се загријава од Земље) са висином се смањује темп. (од 14 °C до - 55 °C)
- Кондензацијом водене паре настају облаци и падавине
- Темп. опада за 6,5 °C на 1 км повећања висине



• Тропосфера се састоји од три слоја:

1. Приземни слој (до 100 м висине)



Велика дневна колебања температуре и влажности ваздуха

2. Погранични слој (100-1500 м)



Такође, велика дневна колебања температуре и влажности ваздуха, због смањења трења са висином се повећава брзина вјетра.

3. Виши слој или слободна атмосфера (1500 м до горње границе тропосфере)




У овом слоју се образују сви типови облака.




До 36 км висине 99%
укупне масе атмосфере


- Стратосфера има углавном уједначену температуру која расте с висином због присуства велике количине озона
- Озон се загријава упијањем штетних ултраљубичастих зрака, штитећи на тај начин живи свијет на Земљи.
- Због сувоће ваздуха у стратосфери нема облака.
- Слој са озоном назива се озоносфера (озонски омотач).




- Озонски омотач је слој који садржи високе концентрације озона (O_3). Овај слој апсорбује 93-99% Сунчеве свјетлости високих фреквенција (ултравиолетна свјетлост), која је штетна за живи свијет на Земљи.
- Преко 91% озона у атмосфери је присутно у овом слоју. Озонски омотач се простире у доњем слоју стратосфере од око 10 до 50 километара изнад Земље.
- Његова дебљина варира у зависности од локације и годишњег доба.



- У мезосфери варира температура
- Одликује се наглим падом
- Од 55-85 км висине




- Термосфера (јоносфера) је веома моћан слој (85-800 км)
- Одликује се наглим порастом температуре.
- На висини од око 250 километара достиже $+250^{\circ}\text{C}$.
- Ваздушне честице наелектрисане позитивно и негативно (јони) па се назива и јоносфера



- Висина од 120 km означава границу гдје атмосферски утицаји постају видљиви током уласка свемирске летјелице у атмосферу.
- Такође се често као границу атмосфере и свемира узима Карманова линија на удаљености од 100 km од површине.



- Егзосфера крајњи слој (од 800 до 3 000 км)
- Атмосфера не завршава нагло него постаје све рјеђа и поступно нестаје у свемиру.
- Не постоји јасна и коначна граница између атмосфере и вањског свемира.
- Температура у егзосфери достиже до +1500 °С
- Земљина корона – наставак егзосфере (2,000-20,000 км)



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

